

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шуматов Валентин Борисович

Должность: Ректор

Дата подписания: 18.10.2023 11:35:33

Уникальный программный ключ:

1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94f0e387a2985d2657b784aec019bf8a794cb4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор института



/ Невзорова В.А. /

« 07 » июня 2023 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Б1.О.45 Геронтология и гериатрия
основной образовательной программы
высшего образования

Направление подготовки
(специальность)

31.05.01 Лечебное дело

Уровень подготовки

специалитет

Направленность подготовки

02 Здравоохранение (в сфере оказания
первичной медико-санитарной помощи
населению в медицинских
организациях: поликлиниках,
амбулаториях, стационарно-
поликлинических учреждениях
здравоохранения и лечебно-
профилактических учреждениях,
оказывающих первичную медико-
санитарную помощь)

Форма обучения

очная

Срок освоения ООП

6 лет

Институт/кафедра

Институт терапии и инструментальной
диагностики

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации, критерии оценивания с помощью которых можно оценивать поэтапное формирование компетенций.

1.2. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета), направленности 02 Здравоохранение (в сфере оказания первичной медико-санитарной помощи населению в медицинских организациях: поликлиниках, амбулаториях, стационарно-поликлинических учреждениях здравоохранения и лечебно-профилактических учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь) **универсальных (УК) компетенций, общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций**
[https://tgmu.ru/sveden/files/31.05.01_Lechebnoe_delo_2023\(2\).pdf](https://tgmu.ru/sveden/files/31.05.01_Lechebnoe_delo_2023(2).pdf)

Наименование категории (группы) компетенций	Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции
Общепрофессиональные компетенции		
Диагностические и инструментальные методы обследования	ОПК-4 Способен применять медицинские изделия, предусмотренные порядком оказания медицинской помощи, а также проводить обследование пациента с целью установления диагноза	ИДК.ОПК-4 ₁ - применяет медицинские изделия для диагностики, лечения, реабилитации в соответствии с порядками оказания медицинской помощи ИДК.ОПК-4 ₂ - проводит обследование пациента с использованием общеклинических, лабораторных и инструментальных методов ИДК.ОПК-4 ₃ - оценивает результаты проведенного обследования с целью установления диагноза
Профессиональные компетенции		
А/02.7 Проведение обследования пациента с целью установления диагноза	ПК-3 Способность и готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания	ИДК.ПК-3 ₁ - проводит интерпретацию данных лучевого исследования; ИДК.ПК-3 ₂ - устанавливает рентгенологические и другие лучевые симптомы заболеваний с учетом стадии развития патологического процесса; ИДК.ПК-3 ₃ - определяет необходимый объем дополнительных методов диагностики, дает оценку их результатам для распознавания состояния, установления факта наличия или отсутствия заболевания
	ПК-4 Способность и готовность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем	ИДК.ПК-4 ₁ - опознает по данным лучевого исследования изображение органов человека, основные анатомические структуры; ИДК.ПК-4 ₂ - диагностирует синдромы, основные нозологические формы на основании результатов лучевого исследования; ИДК.ПК-4 ₃ - устанавливает окончательный диагноз и формулирует его в соответствии с МКБ

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды контроля	Оценочные средства
		Форма
1	Текущий контроль	Вопросы для собеседования
2	Промежуточная аттестация	Тесты Ситуационные задачи

3. Содержание оценочных средств контроля (текущего и промежуточного).

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме собеседования по вопросам, решения ситуационных задач, тестирования. Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в форме собеседования по вопросам, решения ситуационных задач.

3.1. Контрольные вопросы для собеседования по дисциплине Б1.О.45 Геронтология и гериатрия

1. Старческая астения, определение, распространенность
2. Факторы риска и патогенез старческой астении
3. Основные гериатрические синдромы
4. Нарушения зрения
5. Нарушения слуха
6. Нарушение питания у пожилых людей
7. Саркопения
8. Пролежни
9. Нарушения сна у пожилых людей
10. Головокружения и расстройства равновесия в пожилом возрасте. Падения
11. Синкопальные состояния
12. Недержание мочи
13. Клинические проявления и алгоритм диагностики синдрома старческой астении
14. Оценка независимости и автономии
15. Методика проведения комплексной гериатрической оценки у пациентов пожилого и старческого возраста, включающей оценку физического состояния, функционального статуса, психического здоровья и социально-экономических условий жизни пациента
16. Методика сбора жалоб, анамнеза жизни у пациентов пожилого и старческого возраста (лиц, осуществляющих уход)
17. Методика физикального обследования пациентов пожилого и старческого возраста, в том числе методика измерения артериального давления.
18. Особенности фармакотерапии пожилого человека.
19. Медицинские показания для направления пациентов пожилого и старческого возраста для оказания паллиативной медицинской помощи.
20. Основы медицинской реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста
21. Порядок организации медицинской реабилитации пациентов пожилого и старческого возраста
22. Использование диетотерапии у лиц пожилого возраста с риском развития синдрома мальнутриции или синдрома саркопении

3.2. Тестовые задания по дисциплине Б1.О.45 Геронтология и гериатрия

1. Геронтология - это

- а) *наука о старении организма
- б) наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте

- в) наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом возрасте
- г) все вышеперечисленное

2. Гериатрия - это

- а) наука о старении организма
- б) *наука, изучающая особенности течения заболеваний в пожилом и старческом возрасте
- в) наука, изучающая особенности сочетанной патологии в пожилом и старческом возрасте
- г) все вышеперечисленное

3. Пожилым считается возраст

- а) 45-59 лет
- б) *60-74 года
- в) 75-89 лет
- г) 90 и более лет

4. Старческим считается возраст

- а) 45-59 лет
- б) 60-74 года
- в) *75-89 лет
- г) 90 и более лет

5. Определите возраст долгожителей

- а) 45-59 лет
- б) 60-74 года
- в) 75-89 лет
- г) *90 и более лет

6. Физиологически стареющими можно признать

- а) 1-2% пожилых и старых людей
- б) *3-6% пожилых и старых людей
- в) 7-10% пожилых и старых людей
- г) 10-15% пожилых и старых людей

7. Большинство пациентов пожилого и старческого возраста получают медицинскую помощь

- а) *в учреждениях амбулаторно-поликлинического профиля
- б) в стационарах
- в) в гериатрических центрах
- г) в санаториях

8. Старческая астения - это

- а) *ключевой гериатрический синдром, характеризующийся возраст-ассоциированным снижением физиологического резерва и функций многих систем организма, с высоким риском развития неблагоприятных исходов для здоровья, потери автономности и смерти
- б) закономерно наступающий заключительный период возрастного развития
- в) процесс, стабилизирующий жизнедеятельность, увеличивающий продолжительность жизни
- г) все вышеперечисленное

9. К гериатрическим синдромам относятся

- а) #саркопения
- б) #синдром падений
- в) синдром артериальной гипертензии

- г) метаболический синдром
- д) хроническая сердечная недостаточность
- е) #синдром мальнутриции
- ж) #деменция

10. Гериатрия ориентирована на оказание медико-социальной помощи пациентам старших возрастных групп, которые

- а) имеют хронические заболевания
- б) *имеют гериатрические синдромы
- в) *имеют хронические заболевания и гериатрические синдромы
- г) всем пациентам старше 60 лет

11. Синдром старческой астении

- а) характеризуется повышением адаптационного и восстановительного резерва
- б) *характеризуется снижением адаптационного и восстановительного резерва
- в) улучшает прогноз состояния здоровья
- г) *способствует развитию зависимости от посторонней помощи в повседневной жизни

12. Синдром старческой астении

- а) *потенциально обратим
- б) потенциально необратим
- в) является неотъемлемой частью процесса старения
- г) *неблагоприятный вариант старения

13. Наличие синдрома старческой астении у пациента

- а) *повышает риск падений и переломов
- б) снижает риск падений и переломов
- в) *повышает количество госпитализаций
- г) снижает количество госпитализаций

14. К факторам риска развития старческой астении

- а) высокий уровень физической активности
- б) высокий уровень дохода
- в) *одинокое проживание
- г) *депрессия
- д) *низкий уровень образования

15. К клиническим признакам синдрома старческой астении относятся

- а) *саркопения
- б) сахарный диабет
- в) *недержание мочи
- г) *деменция
- д) ОНМК в анамнезе

16. Функциональные признаки возможного наличия синдрома старческой астении

- а) хорошая физическая выносливость
- б) *нарушение равновесия, падения в анамнезе
- в) *зависимость от посторонней помощи
- г) отсутствие ограничения мобильности

17. Симптомы старческой астении

- а) *являются проявлениями гериатрических синдромов
- б) *могут являться проявлениями хронических заболеваний

- в) позволяют отказаться от диагностического поиска в отношении других заболеваний
- 18. Распространенность синдрома старческой астении среди проживающих дома людей 65 лет и старше**
- а) 5%
 - б) *5-17%
 - в) 20-35%
 - г) 35-50%
- 19. Распространенность синдрома старческой астении в домах престарелых может достигать**
- а) 5-10%
 - б) 10-20%
 - в) 20-40%
 - г) *более 50%
- 20. Градацию степени тяжести старческой астении определяют с помощью**
- а) *клинической шкалы старческой астении
 - б) опросника «Возраст не помеха»
 - в) динамометрии
 - г) краткой шкалы оценки питания (MNA)
- 21. Старческая астения сопровождается**
- а) *снижением физической и функциональной активности
 - б) повышением физической и функциональной активности
 - в) *утратой способности к самообслуживанию
 - г) не влияет на способность к самообслуживанию
- 22. Роль традиционных факторов риска в пожилом возрасте**
- а) сохраняется, факторы старческой астении не важны
 - б) *сохраняется, но факторы старческой астении выходят на первое место
 - в) не сохраняется
- 23. Скрининг на предмет наличия синдрома старческой астении осуществляется**
- а) *в отделениях и кабинетах медицинской профилактики
 - б) *центрах здоровья
 - в) *кабинетах участкового врача/врача общей практики
 - г) *при нахождении на стационарном лечении
- 24. Короткий валидированный опросник, направленных на выявление основных признаков старческой астении в России**
- а) *опросник «Возраст не помеха»
 - б) *опросник SF-36*
 - в) опросник для оценки качества жизни лиц старшего и пожилого возраста
 - г) госпитальная шкала тревоги и депрессии
- 25. Скрининг старческой астении выполняется**
- а) врачом-гериатром
 - б) *любым медицинским работником, контактирующим с пациентом 60 лет и старше
 - в) социальным работником
- 26. Комплексная гериатрическая оценка проводится**
- а) *врачом-гериатром

- б) любым медицинским работником, контактирующим с пациентом 60 лет и старше
 - в) социальным работником
- 27. Пациенты, имеющие 1-2 гериатрических синдрома, относятся к**
- а) «хрупким» пациентам
 - б) *«прехрупким» пациентам
 - в) «крепким» пациентам
- 28. Пациенты, имеющие 3 и более гериатрических синдрома, относятся к**
- а) *«хрупким» пациентам
 - б) «прехрупким» пациентам
 - в) «крепким» пациентам
- 29. Консультация врача-гериатра обязательна для всех**
- а) *«хрупких» пациентов
 - б) «прехрупких» пациентов
 - в) «крепких» пациентов
- 30. Скрининг синдрома старческой астении с использованием опросника «Возраст не помеха» рекомендуется проводить**
- а) всем пациентам 45 лет и старше, обратившимся за медицинской помощью
 - б) *всем пациентам 60 лет и старше, обратившимся за медицинской помощью
 - в) только пациентам 60 лет и старше, обратившимся к гериатру
- 31. Выявление синдрома старческой астении определяет**
- а) *прогноз для здоровья и жизни пациента
 - б) показания для госпитализации
 - в) *тактику ведения пациента
 - г) *потребность в посторонней помощи и в уходе
- 32. Быстрое (дни, недели) снижение функциональной активности характерно для**
- а) синдрома старческой астении
 - б) *декомпенсации хронических заболеваний
 - в) *присоединения острых заболеваний/состояний
 - г) *развития осложнений медикаментозной терапии
- 33. Пациентов с результатом 3-4 балла по скрининговому опроснику «Возраст не помеха» рекомендовано**
- а) направлять в гериатрический кабинет для выполнения комплексной гериатрической оценки
 - б) *направлять в гериатрический кабинет с целью уточнения гериатрического статуса и определения показаний для выполнения комплексной гериатрической оценки
 - в) не рекомендовано направлять в гериатрический кабинет
- 34. Комплексная гериатрическая оценка проводится с целью**
- а) определения группы инвалидности
 - б) определения группы здоровья
 - в) диспансеризации
 - г) *разработки плана лечения и наблюдения пациента, направленного на восстановление или поддержание уровня его функциональной активности
- 35. Комплексная гериатрическая оценка может проводиться**
- а) *амбулаторно в гериатрическом кабинете

- б) *стационарно в гериатрическом отделении
- в) в отделе социальной защиты населения
- г) *на дому у пациента

36. В проведении комплексной гериатрической оценки участвует

- а) *врач-гериатр
- б) *медицинская сестра, подготовленная для работы в гериатрии
- в) *специалист по социальной работе
- г) *инструктор-методист по лечебной физкультуре

37. Длительность комплексной гериатрической оценки составляет

- а) менее 30 минут
- б) 30 минут - 1 час
- в) *1,5-2 часа
- г) более 4 часов

38. В амбулаторных условиях рекомендовано выполнение комплексной гериатрической оценки

- а) *врачом-гериатром в гериатрическом кабинете/отделении с возможным разделением на несколько визитов
- б) участковым врачом-терапевтом или врачом общей практики во время проведения диспансеризации
- в) *до осмотра врачом-гериатром, ряд тестов, измерений и оценок по шкалам проводится медицинской сестрой, имеющей подготовку по гериатрии

39. Если комплексная гериатрическая оценка проводится в период госпитализации пациента по поводу острого/обострения хронического заболевания, рекомендовано ее выполнение

- а) сразу при поступлении пациента в стационар
- б) *после стабилизации состояния перед выпиской пациента
- в) в любое время за период пребывания пациента в стационаре

40. При проведении комплексной гериатрической оценки в первую очередь рекомендовано выполнять

- а) тесты для оценки физического состояния
- б) оценку эмоционального состояния
- в) оценку потребности в социальной помощи
- г) *тесты для оценки когнитивных функций

41. Синдром мальнутриции или недостаточности питания

- а) *высоко распространен у пациентов пожилого и старческого возраста
- б) редко встречается у пациентов пожилого и старческого возраста
- в) нет точных данных о распространенности синдрома

42. Синдром мальнутриции определяется при постепенном снижении массы тела на протяжении 6 месяцев при отсутствии сопутствующей соматической, неврологической или онкологической патологии

- а) *не более чем на 10%
- б) на 15%
- в) на 20%

43. Развитие синдрома недостаточности питания у пожилых пациентов связано с

- а) *снижением качества жизни

- б) повышением качества жизни
- в) *повышением риска падений
- г) низкой летальностью

44. Крайняя форма мальнутриции

- а) анорексия
- б) булимия
- в) *кахексия
- г) тиреотоксикоз

45. К причинам развития мальнутриции относятся

- а) *полипрагмазия
- б) *деменция
- в) *сенильная анорексия
- г) удовлетворительный когнитивный статус

46. К факторам риска развития мальнутриции у пожилых людей относят

- а) *снижение физической активности
- б) независимость от посторонней помощи
- в) *запоры
- г) *отсутствие зубов

47. Синдром мальнутриции и синдром старческой астении

- а) *тесно связаны
- б) не имеют связи
- в) связь этих синдромов не доказана

48. Патогенетическая роль мальнутриции в формировании гериатрического каскад связана с

- а) *снижением поступления нутриентов
- б) снижением продукции провоспалительных цитокинов
- в) увеличением поступления нутриентов
- г) *увеличением продукции провоспалительных цитокинов

49. У пациентов с синдромом мальнутриции

- а) повышается метаболический индекс
- б) *формируется саркопения
- в) повышается физическая выносливость
- г) *развивается мышечная слабость

50. Недостаточности питания легкой степени соответствует индекс массы тела (ИМТ, кг/м²)

- а) 19-25
- б) *17-18,9
- в) 16-19,9
- г) менее 16

51. Недостаточности питания средней степени соответствует индекс массы тела (ИМТ, кг/м²)

- а) 19-25
- б) 17-18,9
- в) *16-19,9
- г) менее 16

52. Недостаточности питания тяжелой степени соответствует индекс массы тела (ИМТ, кг/м²)

- а) 19-25
- б) 17-18,9
- в) *16-19,9
- г) менее 16

53. Распространенность синдрома недостаточности питания среди клиентов социальных учреждений стационарного типа составляет

- а) 10%
- б) 20%
- в) 30%
- г) *более 40%

54. Для скрининга нарушения питания (синдрома мальнутриции) применяется опросник

- а) *краткая шкала оценки питания (MNA)
- б) «Возраст не помеха»
- в) краткая шкала оценки психического статуса (MMSE)
- г) Монреальская шкала оценки когнитивных функций

55. Уровень альбумина менее 25 г/л соответствует мальнутриции

- а) легкой степени
- б) средней степени
- в) *тяжелой степени

Критерии оценивания

«Отлично» - более 80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Хорошо» - 70-79% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Удовлетворительно» - 55-69% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Неудовлетворительно» - менее 55% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

3.3. Ситуационные задачи по дисциплине Б1.О.45 Геронтология и гериатрия

Ситуационная задача 1

На приеме у гериатра пациент мужчина 78 лет. Живет один, ежедневно приезжают сын или внук и помогают пациенту. Пациент нуждается в помощи почти во всех видах инструментальной функциональной активности (финансовые вопросы, транспорт, прием препаратов). Возникают проблемы с самостоятельным совершением покупок, с прогулками, приготовлением пищи и выполнением работы по дому. Нуждается в помощи при подъеме по лестнице, при выполнении гигиенических мероприятий. Минимальная потребность в помощи с одеванием. Круг общения и социальных контактов ограничен. Из-за плохого зрения пациенту трудно находить дорогу домой, когда идет из магазина, трудно читать обычный газетный шрифт. За последние 6 месяцев падал 3 раза, падения связывает с плохим зрением. Переломов не было. По заключению психиатра у пациента имеется деменция легкой степени. Базовая функциональная активность с использованием анкеты индекса Бартел 70 баллов (умеренно снижен). Инструментальная функциональная активность по шкале Лоутона 2/8 (значительно снижена).

Вопрос 1. Имеются ли у пациента гериатрические синдромы?

- а) у пациента отсутствуют гериатрические синдромы
- б) у пациента имеются единичные гериатрические синдромы
- в) *у пациента имеются множественные гериатрические синдромы
- г) для выводов недостаточно данных

Вопрос 2. Какие гериатрические синдромы вы можете выделить у пациента?

- а) у пациента отсутствуют гериатрические синдромы
- б) *снижение мобильности
- в) *синдром падений
- г) *функциональные нарушения
- д) *снижение зрения
- е) снижение слуха
- ж) недержание мочи
- з) недостаточность питания

Вопрос 3. Оцените состояние пациента по клинической шкале старческой астении

- а) преастения
- б) легкая старческая астения
- в) *умеренная старческая астения
- г) тяжелая старческая астения
- д) очень тяжелая старческая астения

Вопрос 4. К какой функциональной категории относится пациент?

- а) независим от посторонней помощи
- б) в основном независим от посторонней помощи
- в) *зависим от посторонней помощи
- г) полностью зависим от посторонней помощи

Ситуационная задача

75-летний мужчина обратился к терапевту с жалобами на головокружение, пошатывание при ходьбе. За последние 4 месяца падал 3 раза, были ушибы конечностей, переломов не было. Падения случались как дома, так и на улице; вставал самостоятельно, посторонняя помощь не требовалась. Зрение снижено, у окулиста не был около 4 лет, очки носит, но отмечает, что зрение не достаточно компенсировано. Отмечает снижение настроения. У врача-терапевта не был около 3 лет. Какие-либо лекарственные препараты для регулярного приема не назначались. При объективном исследовании: общее состояние удовлетворительное; кожные покровы бледно-розового цвета; пульс 62 удара в минуту, АД 130/75 мм рт. ст. Тоны сердца ясные, ритмичные, шумов нет. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Печень, селезенка не увеличены. Контуры суставов не изменены, движения в суставах в полном объеме. Отеков нет. Кожные и сухожильные рефлексy не изменены. Патологические рефлексy не выявлены.

1. Для обследования пациента рекомендованы

- а) *тест на скорость ходьбы
- б) *краткая шкала оценки психического статуса
- в) *тест на физическую работоспособность (Short Physical Performance Battery (SPPB))
- г) *тест «Встань и иди»
- д) тредмил-тест
- е) *динамометрия

2. Для обеспечения углубленной коррекции модифицируемых факторов риска падений пациент должен быть направлен на консультацию к

- а) *врачу-гериатру
- б) врачу-ортопеду-травматологу

- в) *врачу-неврологу
- г) *врачу-офтальмологу
- д) врачу клиническому фармакологу

3. Для профилактики падений используют

- а) *лечебное питание с количеством белка 1,2–1,5 г/кг/день
- б) лечебное питание с количеством белка 0,5 г/кг/день
- в) *занятия лечебной физкультурой
- г) *назначение витамина D

Ситуационная задача 3

Функциональная активность пожилого человека является основой для планирования тактики наблюдения и определяет приоритеты при принятии любого медицинского решения.

На приеме у гериатра пациент мужчина 70 лет. Живет один, ежедневно приезжают родственники и помогают пациенту. Пациент нуждается в помощи почти во всех видах инструментальной функциональной активности (финансовые вопросы, транспорт, прием препаратов). Возникают проблемы с самостоятельным совершением покупок, с прогулками, приготовлением пищи и выполнением работы по дому. Нуждается в помощи при подъеме по лестнице, при выполнении гигиенических мероприятий. Минимальная потребность в помощи с одеванием. Круг общения и социальных контактов ограничен. Из-за плохого зрения пациенту трудно находить дорогу домой, когда идет из магазина, трудно читать обычный газетный шрифт. За последние 6 месяцев падал 3 раза, падения связывает с плохим зрением. Переломов не было. По заключению психиатра у пациента имеется деменция легкой степени.

Результаты дополнительных тестов:

Динамометрия: сила сжатия кисти 25 кг

Краткая батарея тестов физического функционирования:

определение равновесия: 1 балл

тест скорости ходьбы 7 сек. (2 балла), скорость ходьбы 0,5 м/с

тест подъема со стула 14 сек. (2 балла)

Вопрос 1. Оцените функциональную активность пациента

- а) *функциональная активность снижена
- б) функциональная активность сохранена

Вопрос 2. Какие параметры используются для оценки наличия саркопении у пациента

- а) индекс массы тела
- б) *сила сжатия кисти
- в) *тест вставания со стула
- г) окружность талии

Вопрос 3. Перечислите возможные виды исследований для подтверждения саркопении

- а) ФГДС
- б) *двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DXA)
- в) *биоимпедансометрия (BIA)
- г) *КТ
- д) *МРТ
- е) ЭКГ

Ситуационная задача 4

На приеме у гериатра женщина 83 лет. Живет одна, 2-3 раза в неделю приезжают родственники и помогают пациентке. Нуждается в помощи почти во всех видах инструментальной функциональной активности (финансовые вопросы, транспорт, прием

препаратов). Возникают проблемы с самостоятельным совершением покупок, с прогулками, приготовлением пищи и выполнением работы по дому. Одна из дома не выходит, нуждается в помощи при подъеме по лестнице, при выполнении гигиенических мероприятий. Питается не регулярно, отмечает отсутствие аппетита и быстрое насыщение небольшим количеством еды, может забыть о приеме пищи. Прием пищи 1-2 раза в день. Имеет проблемы с зубами: вставные зубные протезы натирают, пользуется ими не часто. Белковую пищу употребляет 1 раз в неделю, предпочитает углеводное питание. На момент осмотра ИМТ $16,7 \text{ кг/м}^2$, окружность плеча 20 см, толщина кожной складки над трицепсом 7 мм, отеков нет.

Вопрос 1. Для скрининга нарушения питания (синдрома мальнутриции) применяется опросник

- д) *краткая шкала оценки питания (MNA)
- е) «Возраст не помеха»
- ж) шкала «Базовая функциональная активность»
- з) шкала «Инструментальная функциональная активность»

Вопрос 2. Имеются ли у пациентки признаки нарушения питания?

- д) у пациента отсутствуют признаки нарушения питания
- е) у пациента имеются единичные признаки нарушения питания
- ж) *у пациента имеются множественные признаки нарушения питания
- з) для выводов недостаточно данных

Вопрос 3. Какая степень недостаточности питания у пациентки?

- а) слабая недостаточность питания
- б) *средняя недостаточность питания
- в) тяжелая недостаточность питания
- г) для выводов недостаточно данных

Ситуационная задача 5

Пациентка М., 85 лет. В клинику приведена дочерью, которая обратила внимание на прогрессирующее снижение памяти у матери за последний год, в течение которого они живут вместе.

Анамнез. Длительное время страдает артериальной гипертензией (до 170/100 мм рт. ст.), постоянно принимает антигипертензивные препараты, на фоне лечения адаптирована к АД 130-140/80-85 мм рт. ст. Около пяти лет назад выявлена гиперхолестеринемия, с повышением уровня холестерина до 6,8, коэффициент атерогенности 4,1. Длительно принимает аторвастатин 20 мг/сут, Кардиомагнил по одной таблетке в сутки. На фоне лечения показатели липидного спектра в пределах нормы.

Нейровизуализационное исследование. На магнитно-резонансной томограмме (МРТ) – диффузный атрофический процесс, преимущественно теменных, височных и затылочных долей с двух сторон; перивентрикулярный и единичный субкортикальный лейкоареоз.

Соматическое обследование. Пациентка повышенного питания, вес 92 кг при росте 182 см. Артериальное давление 130 и 80 мм рт. ст., частота сердечных сокращений 62 в минуту, частота дыхания 16 в минуту. Гипертрофия левых отделов сердца. Живот мягкий, безболезненный, не вздут. Физиологические отправления в норме.

Неврологический статус. Рефлексы орального автоматизма – хоботковый, Маринеску – Радовичи с двух сторон. Оживленный нижнечелюстной рефлекс. Другой патологии со стороны черепно-мозговых нервов нет. Парезов нет, мышечный тонус не изменен, сухожильные рефлексы живые, симметричные, патологических знаков нет. Чувствительных, координаторных нарушений нет.

Нейропсихологическое тестирование. Правильно ориентирована в месте. Однако путается при рассказе, как проехать от клиники до дома. Дезориентирована во времени – не смогла правильно назвать дату, запуталась с определением года. Проблему отрицает,

считает, что большая часть людей ее возраста тоже не смогут вспомнить правильную дату. Свою память считает хорошей. Результат по Краткой шкале оценки психического статуса 24 балла. В тесте «12 слов» при непосредственном воспроизведении назвала семь слов и три с подсказкой. При отсроченном воспроизведении самостоятельно припомнила три слова и два слова с подсказкой. Имело место одно постороннее вплетение («яблоко» вместо «абрикос»). Не смогла правильно выполнить тест копирования пятиугольников, в одном из пятиугольников четыре угла, ошибку не увидела и не смогла исправить. Запуталась с определением времени на часах. Самостоятельно часы нарисовала с ошибкой (неправильно расставила цифры, не смогла исправить ошибку, не смогла поставить стрелки так, чтобы часы указывали названное исследователем время. Пробу «кулак – ребро – ладонь» выполняет с упрощением как «кулак – ладонь», склонна к обратному развороту кисти. Отмечаются прогрессирующие нарушения памяти гиппокампального характера в сочетании с апракто-агностическим синдромом.

1. В целом состояние пациентки соответствует

- а) *легкой деменции
- б) умеренной деменции
- в) тяжелой деменции

2. Профиль когнитивных нарушений у пациентки соответствует

- а) инволюционному параноиду
- б) инволюционной меланхолии
- в) болезни Паркинсона
- г) *болезни Альцгеймера

3. Пациентке показаны препараты базовой симптоматической терапии

- а) ингибиторы АПФ
- б) *ингибиторы ацетилхолинэстеразы
- в) бензодиазепины
- г) препараты мелатонина

4. Критерии оценивания результатов обучения

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета

«Зачтено» выставляется обучающемуся, если он показал достаточно прочные знания основных положений учебной дисциплины, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты.

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе выявились существенные пробелы в знаниях основных положений учебной дисциплины, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины.