

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шуматов Валентин Борисович

Должность: Ректор

Дата подписания: 01.11.2023 10:24:03

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

Уникальный программный код:

1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fe0387a7985d2657b784eec019hf8a794ch4

«Тихоокеанский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплины B1.B.03 Сердечно-легочная реанимация

Индекс, наименование

основной образовательной программы высшего образования
подготовка кадров высшей квалификации по программам ординатуры
по специальности

**Направление подготовки
(специальность)**

31.08.26 Аллергология и иммунология

Уровень подготовки

ординатура

Направленность подготовки

02 Здравоохранение (в сфере
аллергологии и иммунологии)

Форма обучения

очная

Срок освоения ООП

2 года

Институт/кафедра

Институт симуляционных и
аккредитационных технологий

Владивосток – 2022

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 31.08.01 Акушерство и гинекология, направленности 02 Здравоохранение в сфере профессиональной деятельности акушерство и гинекология универсальных (УК) компетенций и профессиональных (ПК) компетенций

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/ п	Виды контроля	Оценочные средства
		Форма
1	Текущий контроль	Тесты
2	Промежуточная аттестация	Тесты Чек-листы

3. Содержание оценочных средств текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тестирования и оценки практических навыков по чек-листу

Оценочные средства для текущего контроля.

Тесты:

01. В России существует утвержденный стандарт проведения сердечно-легочной реанимации:

- а) да
- б) нет

Ответ: б.

02. Эффективность СЛР в большей степени зависит от:

- а) количества вводимых лекарственных препаратов
- б) ранней интубации
- в) правильности выполнения элементов базовой реанимации
- г) катетеризации центральных вен

Ответ: в.

03. Документы, регламентирующие проведение СЛР на территории Российской Федерации:

- а) Федеральный закон № 323
- б) Приказ главного врача по медицинскому учреждению
- в) Постановление правительства Российской Федерации № 950

г) правильно а и в

Ответ: г.

04. Назовите признаки клинической смерти:

- а) отсутствие сознания, отсутствие самостоятельного дыхания, отсутствие пульса на магистральных артериях
- б) отсутствие сознания, отсутствие реакции зрачков на свет, синюшность кожных покровов, отсутствие пульса, отсутствие дыхания
- в) отсутствие сознания, отсутствие реакции зрачков на свет, трупные гипостазы

Ответ: а.

05. Пострадавший упал с пилона "Золотого моста" (высота 60 м). Сознание, дыхание и пульс отсутствуют. Видимые телесные повреждения отсутствуют. Ваши действия:

- а) признаете это состояние травмой не совместимой с жизнью
- б) немедленно приступите к базовой сердечно-легочной реанимации
- в) первоначально выполните иммобилизацию шейного отдела позвоночника и затем приступите к базовой сердечно-легочной реанимации

Ответ: б.

06. При БСЛР выделяют возрастные группы:

- а) от периода полового созревания и взрослые
- б) дети до 1 года
- в) дети от 1 года до периода полового созревания
- г) все перечисленные

Ответ: г.

07. Как долго следует пальпаторно определять наличие пульса у пациента во время первичной диагностики в ходе начала алгоритма BLS:

- а) От 1 до 5 секунд.
- б) От 5 до 10 секунд.
- в) От 10 до 15 секунд.
- г) От 15 до 20 секунд.

Ответ: б.

08. Во время осмотра пациент внезапно потерял сознание. После вызова помощи и определения, что пациент не дышит, Вы не уверены, есть ли у пациента пульс. Каким будет Ваше следующее действие:

- а) Начать компрессии на грудную клетку.
- б) Произвести два вдоха искусственного дыхания.
- в) Покинуть место оказания помощи и принести автоматический электрический дефибриллятор.
- г) Проверить содержимое ротовоглотки на предмет обнаружения инородных тел.

Ответ: а.

09. Какова правильная рекомендуемая частота компрессий на грудную клетку по время проведения СЛР:

- а) 60 – 80 в минуту.
- б) 80 – 100 в минуту.
- в) Около 100 в минуту.
- г) Не менее 100 в минуту.

Ответ: г.

10. У пациента 45 лет Вы определили отсутствие сознания и дыхания, следующее действие:

- а) зарезервировать помощника
- б) начать компрессии грудной клетки
- в) начать ИВЛ
- г) ничего не предпринимать

Ответ: б.

11. Уровень энергии, используемы для дефибрилляции выполняемой оборудованием с бифазным электрическим разрядом у взрослых:
- а) 200 Дж
 - б) 120 Дж
 - в) 360 Дж
 - г) 240 Дж

Ответ: а.

12. Виды дефибрилляции:
- а) электрическая.
 - б) химическая.
 - в) механическая.
 - г) Всё перечисленное.

Ответ: г.

13. Препарат, применяемый не зависимо от вида электрической остановки сердца:
- а) кордарон.
 - б) адреналин.
 - в) налоксон.
 - г) лидокаин

Ответ: б.

14. Пути введения лекарственных препаратов при сердечно-легочной реанимации:
- а) эндотрахеальный
 - б) центральный венозный
 - в) периферические вены верхней половины тела
 - г) внутримышечный.

Ответ: в.

15. Вид остановки сердца, требующий дефибрилляции:
- а) фибрилляция желудочков
 - б) желудочковая тахикардия с пульсом
 - в) асистолия
 - г) электро-механическая диссоциация

Ответ: а.

16. Вид дефибрилляции, относящийся к базовому реанимационному комплексу:
- а) ручная дефибрилляция
 - б) полуавтоматическая дефибрилляция
 - в) автоматическая внутренняя дефибрилляция
 - г) автоматическая наружная дефибрилляция

Ответ: г.

17. Проблемы, затрудняющие применение классической дефибрилляции:
- а) оборудование размещено только в отделениях реанимации и машинах СМП
 - б) оборудование сложное в управлении
 - в) сложность распознавания вида электрической остановки сердца
 - г) всё перечисленное

Ответ: г.

18. Вид остановки сердца, требующий дефибрилляции:
- а) фибрилляция желудочков
 - б) желудочковая тахикардия с пульсом
 - в) асистолия
 - г) электро-механическая диссоциация

Ответ: а.

19. Вид остановки сердца, не требующий дефибрилляции:
- а) фибрилляция желудочков
 - б) электро-механическая диссоциация
 - в) атриовентрикулярная блокада I степени
 - г) желудочковая тахикардия без пульса

Ответ: б.

20. Использование АНД случайными свидетелями (на улице) на территории Российской Федерации по состоянию на январь 2021 года:
- а) регламентировано постановлением правительства №950
 - б) регламентировано Приказом МЗ №224
 - в) не регламентировано

Ответ: в.

21. Уровень энергии, используемы для дефибрилляции выполняемой оборудованием с бифазным электрическим разрядом:
- а) 2-4 Дж/кг
 - б) 120 Дж
 - в) 360 Дж
 - г) 240 Дж

Ответ: а.

22. Виды дефибрилляции, применяемые у детей от 1 года до периода полового созревания:
- а) электрическая.
 - б) химическая.
 - в) механическая.
 - г) правильно а и б.

Ответ: г.

23. Препарат, применяемый не зависимо от вида электрической остановки сердца у детей всех возрастных групп:
- а) кордарон.
 - б) адреналин.
 - в) налоксон.
 - г) лидокаин

Ответ: б.

24. Пути введения лекарственных препаратов при сердечно-легочной реанимации у детей старше 1 года:
- а) эндотрахеальный
 - б) центральный венозный
 - в) периферические вены верхней половины тела
 - г) внутримышечный.

Ответ: в.

25. Какой вид остановки сердца чаще наблюдается у детей до 1 года:
- а) фибрилляция желудочков
 - б) желудочковая тахикардия с пульсом
 - в) асистолия
 - г) электро-механическая диссоциация
 - д) правильно в и г

Ответ: д.

Критерии оценивания:

«Отлично» - 91-100% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Хорошо» - 81-90% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Удовлетворительно» - 70-80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня
«Неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

4. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой.

Тесты:

15. Уровень энергии, используемы для дефибрилляции выполняемой оборудованием с бифазным электрическим разрядом у детей:
- а) 2-4 Дж/кг
 - б) 120 Дж
 - в) 360 Дж
 - г) 240 Дж

Ответ: а.

16. Виды дефибрилляции, применяемые у детей от 1 года до периода полового созревания:
- а) электрическая.
 - б) химическая.
 - в) механическая.
 - г) правильно а и б.

Ответ: г.

17. Препарат, применяемый не зависимо от вида электрической остановки сердца у детей всех возрастных групп:
- а) кордарон.
 - б) адреналин.
 - в) налоксон.
 - г) лидокаин

Ответ: б.

18. Пути введения лекарственных препаратов при сердечно-легочной реанимации у детей старше 1 года:
- а) эндотрахеальный
 - б) центральный венозный
 - в) периферические вены верхней половины тела
 - г) внутримышечный.

Ответ: в.

05. Какой вид остановки сердца чаще наблюдается у детей до 1 года:

- а) фибрилляция желудочков
- б) желудочковая тахикардия с пульсом
- в) асистолия
- г) электро-механическая диссоциация
- д) правильно в и г

Ответ: д.

06. При БСЛР выделяют возрастные группы:
- а) от периода полового созревания и взрослые
 - б) дети до 1 года
 - в) дети от 1 года до периода полового созревания
 - г) все перечисленные

Ответ: г.

07. Как долго следует пальпаторно определять наличие пульса у пациента во время первичной диагностики в ходе начала алгоритма BLS:
- а) От 1 до 5 секунд.
 - б) От 5 до 10 секунд.
 - в) От 10 до 15 секунд.
 - г) От 15 до 20 секунд.

Ответ: б.

08. Во время осмотра пациент внезапно потерял сознание. После вызова помощи и определения, что пациент не дышит, Вы не уверены, есть ли у пациента пульс. Каким будет Ваше следующее действие:
- а) Начать компрессии на грудную клетку.
 - б) Произвести два вдоха искусственного дыхания.
 - в) Покинуть место оказания помощи и принести автоматический электрический дефибриллятор.
 - г) Проверить содержимое ротоглотки на предмет обнаружения инородных тел.

Ответ: а.

09. Какова правильная рекомендуемая частота компрессий на грудную клетку по время проведения СЛР:
- а) 60 – 80 в минуту.
 - б) 80 – 100 в минуту.
 - в) Около 100 в минуту.
 - г) Не менее 100 в минуту.

Ответ: г.

10. У пациента 45 лет Вы определили отсутствие сознания и дыхания, следующее действие:
- а) зарезервировать помощника
 - б) начать компрессии грудной клетки
 - в) начать ИВЛ
 - г) ничего не предпринимать

Ответ: б.

11. Уровень энергии, используемы для дефибрилляции выполняемой оборудованием с бифазным электрическим разрядом у взрослых:
- а) 200 Дж
 - б) 120 Дж

- в) 360 Дж
- г) 240 Дж

Ответ: а.

12. Виды дефибрилляции:
- а) электрическая.
 - б) химическая.
 - в) механическая.
 - г) Всё перечисленное.

Ответ: г.

13. Препарат, применяемый не зависимо от вида электрической остановки сердца:
- а) кордарон.
 - б) адреналин.
 - в) налоксон.
 - г) лидокаин

Ответ: б.

14. Пути введения лекарственных препаратов при сердечно-легочной реанимации:
- а) эндотрахеальный
 - б) центральный венозный
 - в) периферические вены верхней половины тела
 - г) внутримышечный.

Ответ: в.

15. Вид остановки сердца, требующий дефибрилляции:
- а) фибрилляция желудочков
 - б) желудочковая тахикардия с пульсом
 - в) асистолия
 - г) электро-механическая диссоциация

Ответ: а.

16. Вид дефибрилляции, относящийся к базовому реанимационному комплексу:
- а) ручная дефибрилляция
 - б) полуавтоматическая дефибрилляция
 - в) автоматическая внутренняя дефибрилляция
 - г) автоматическая наружная дефибрилляция

Ответ: г.

17. Проблемы, затрудняющие применение классической дефибрилляции:
- а) оборудование размещено только в отделениях реанимации и машинах СМП
 - б) оборудование сложное в управлении
 - в) сложность распознавания вида электрической остановки сердца
 - г) всё перечисленное

Ответ: г.

18. Вид остановки сердца, требующий дефибрилляции:
- а) фибрилляция желудочков
 - б) желудочковая тахикардия с пульсом
 - в) асистолия
 - г) электро-механическая диссоциация

Ответ: а.

19. Вид остановки сердца, не требующий дефибрилляции:

- а) фибрилляция желудочков
- б) электро-механическая диссоциация
- в) атриовентрикулярная блокада I степени
- г) желудочковая тахикардия без пульса

Ответ: б.

20. Использование АНД случайными свидетелями (на улице) на территории Российской Федерации по состоянию на январь 2021 года:
- а) регламентировано постановлением правительства №950
 - б) регламентировано Приказом МЗ №224
 - в) не регламентировано

Ответ: в.

21. В России существует утвержденный стандарт проведения сердечно-легочной реанимации:
- а) да
 - б) нет

Ответ: б.

22. Эффективность СЛР в большей степени зависит от:
- а) количества вводимых лекарственных препаратов
 - б) ранней интубации
 - в) правильности выполнения элементов базовой реанимации
 - г) катетеризации центральных вен

Ответ: в.

23. Документы, регламентирующие проведение СЛР на территории Российской Федерации:
- а) Федеральный закон № 323
 - б) Приказ главного врача по медицинскому учреждению
 - в) Постановление правительства Российской Федерации № 950
 - г) правильно а и в

Ответ: г.

24. Назовите признаки клинической смерти:
- а) отсутствие сознания, отсутствие самостоятельного дыхания, отсутствие пульса на магистральных артериях
 - б) отсутствие сознания, отсутствие реакции зрачков на свет, синюшность кожных покровов, отсутствие пульса, отсутствие дыхания
 - в) отсутствие сознания, отсутствие реакции зрачков на свет, трупные гипостазы

Ответ: а.

25. Пострадавший упал с пилона "Золотого моста" (высота 60 м). Сознание, дыхание и пульс отсутствуют. Видимые телесные повреждения отсутствуют. Ваши действия:
- а) признаете это состояние травмой не совместимой с жизнью
 - б) немедленно приступите к базовой сердечно-легочной реанимации
 - в) первоначально выполните иммобилизацию шейного отдела позвоночника и затем приступите к базовой сердечно-легочной реанимации

Ответ: б.

Чек-листы:

Смотри приложения 1, 2, 3

Критерии оценивания:

«Отлично» - 91% – 100% (15-16 баллов)
«Хорошо» - 81% - 90% (13 -14 баллов)
«Удовлетворительно» - 70% - 80% (11 - 12 баллов)
«Неудовлетворительно» - менее 70% (10 баллов и менее)

5. Критерии оценивания результатов обучения

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы. Демонстрирует практические навыки в пределах значений предъявляемых к выполнению.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. Демонстрирует практические навыки в пределах средних значений предъявляемых к выполнению.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если он владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускает ошибки по существу вопросов. Демонстрирует практические навыки в пределах чуть выше минимальных требований к выполнению.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если он не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора и неспособен продемонстрировать практические навыки в пределах минимальных требований к выполнению.

Чек-лист оценки практических навыковНазвание практического навыка Базовый реанимационный комплекс взрослых

К	ОПК-10	Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства		
Ф	Код А/07.8	Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме		
ТД	Выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации			
	Действие		Проведено	Не проведено
1.	Оценил безопасность окружающей обстановки. Применил средства индивидуальной защиты.	1 балл	0 баллов	
2.	Правильно выявил признаки клинической смерти, оценил ситуации, при которых возможен отказ от реанимационных действий.	1 балл	0 баллов	
3.	Правильно подготовил пациента к началу сердечно-легочной реанимации.	1 балл	0 баллов	
4.	Правильно расположил руки на грудной клетке пациента. Начал компрессии. Показатель тренажера «расположение рук» $\geq 90\%$	2 балла	0 баллов	
5.	Показатель тренажера «частота компрессий» $\geq 90\%$	2 балла	0 баллов	
6.	Показатель тренажера «глубина компрессий» $\geq 90\%$	2 балла	0 баллов	
7.	Показатель тренажера «декомпрессия грудной клетки» $\geq 90\%$	2 балла	0 баллов	
8.	Обеспечил проходимость верхних дыхательных путей	1 балл	0 баллов	
9.	Начал ИВЛ самый быстрый и максимально безопасный способ	1 балл	0 баллов	
10.	Показатель тренажера «объём вентиляции» $\geq 80\%$	1 балл	0 баллов	
11.	Соблюдал соотношение компрессий и вентиляций 30:2	1 балл	0 баллов	
12.	Показатель тренажера «итоговый результат» $\geq 70\%$	1 балл	0 баллов	
	Итого			

Шкала оценивания

«Отлично» - 91% – 100% (15-16 баллов)

«Хорошо» - 81% - 90% (13 -14 баллов)

«Удовлетворительно» - 70% - 80% (11 - 12 баллов)

«Неудовлетворительно» - менее 70% (10 баллов и менее)

Чек-лист оценки практических навыков

Название практического навыка Базовый реанимационный комплекс подростки (дети от 1 года до начала периода полового созревания)

К	ОПК-10	Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства		
Ф	Код А/07.8	Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме		
ТД	Выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации			
	Действие		Проведено	Не проведено
1.	Оценил безопасность окружающей обстановки. Применил средства индивидуальной защиты.		1 балл	0 баллов
2.	Правильно выявил признаки клинической смерти, оценил ситуации, при которых возможен отказ от реанимационных действий.		1 балл	0 баллов
3.	Правильно подготовил пациента к началу сердечно-легочной реанимации.		1 балл	0 баллов
4.	Правильно расположил руки на грудной клетке пациента. Начал компрессии. Показатель тренажера «расположение рук» $\geq 90\%$		2 балла	0 баллов
5.	Показатель тренажера «частота компрессий» $\geq 90\%$		2 балла	0 баллов
6.	Показатель тренажера «глубина компрессий» $\geq 90\%$		2 балла	0 баллов
7.	Показатель тренажера «декомпрессия грудной клетки» $\geq 90\%$		2 балла	0 баллов
8.	Обеспечил проходимость верхних дыхательных путей		1 балл	0 баллов
9.	Начал ИВЛ самый быстрый и максимально безопасный способ		1 балл	0 баллов
10.	Показатель тренажера «объём вентиляции» $\geq 80\%$		1 балл	0 баллов
11.	Соблюдал соотношение компрессий и вентиляций 15:2 (не зависимо от количества спасателей)		1 балл	0 баллов
12.	Показатель тренажера «итоговый результат» $\geq 70\%$		1 балл	0 баллов
	Итого			

Шкала оценивания

«Отлично» - 91% – 100% (15-16 баллов)

«Хорошо» - 81% - 90% (13 -14 баллов)

«Удовлетворительно» - 70% - 80% (11 - 12 баллов)

«Неудовлетворительно» - менее 70% (10 баллов и менее)

Чек-лист оценки практических навыковНазвание практического навыка Базовый реанимационный комплекс для детей до 1 года

К	ОПК-10	Способен участвовать в оказании неотложной медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства		
Ф	Код А/07.8	Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме		
ТД	Выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации			
	Действие		Проведено	Не проведено
1.	Оценил безопасность окружающей обстановки. Применил средства индивидуальной защиты.	1 балл	0 баллов	
2.	Правильно выявил признаки клинической смерти, оценил ситуации, при которых возможен отказ от реанимационных действий.	1 балл	0 баллов	
3.	Правильно подготовил пациента к началу сердечно-легочной реанимации.	1 балл	0 баллов	
4.	Правильно расположил руки на грудной клетке пациента. Начал компрессии. Показатель тренажера «расположение рук» $\geq 90\%$	2 балла	0 баллов	
5.	Показатель тренажера «частота компрессий» $\geq 90\%$	2 балла	0 баллов	
6.	Показатель тренажера «глубина компрессий» $\geq 90\%$	2 балла	0 баллов	
7.	Показатель тренажера «декомпрессия грудной клетки» $\geq 90\%$	2 балла	0 баллов	
8.	Обеспечил проходимость верхних дыхательных путей	1 балл	0 баллов	
9.	Начал ИВЛ самый быстрый и максимально безопасный способ	1 балл	0 баллов	
10.	Показатель тренажера «объём вентиляции» $\geq 80\%$	1 балл	0 баллов	
11.	Соблюдал соотношение компрессий и вентиляций 15:2 (не зависимо от количества спасателей)	1 балл	0 баллов	
12.	Показатель тренажера «итоговый результат» $\geq 70\%$	1 балл	0 баллов	
	Итого			

Шкала оценивания

«Отлично» - 91% – 100% (15-16 баллов)

«Хорошо» - 81% - 90% (13 -14 баллов)

«Удовлетворительно» - 70% - 80% (11 - 12 баллов)

«Неудовлетворительно» - менее 70% (10 баллов и менее)