

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стегний Кирилл Владимирович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 24.04.2026 17:10:42
Уникальный программный идентификатор:
d59234ba928aea5c04c54eb9013a767220b6b2ae

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заведующего кафедрой



/Коцюрбий Е.А./

«10» апреля 2025г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Дисциплины Б1.Б.03.02 Патология Модуль Анатомия

Специальность	31.08.46 Ревматология
Уровень подготовки	ординатура
Направленность подготовки	02 Здравоохранение (в сфере ревматологии)
Форма обучения	очная
Срок освоения ООП	2 года
Кафедра	патологической анатомии и судебной медицины

Владивосток, 2025

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.2. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 31.08.46 Ревматология, направленности 02 Здравоохранение (в сфере ревматологии) универсальных (УК) компетенций и профессиональных (ПК) компетенций

[https://tgm.ru/sveden/files/rim/31.08.46_Revmatologiya\(3\).pdf](https://tgm.ru/sveden/files/rim/31.08.46_Revmatologiya(3).pdf)

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды контроля	Оценочные средства
		Форма
1	Текущий контроль	Тесты
2	Промежуточная аттестация	Тесты
		Ситуационные задачи

3. Содержание оценочных средств текущего контроля

Текущий контроль осуществляется преподавателем дисциплины при проведении занятий в форме: тестирования.

ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Для туберкулезной гранулемы характерны:

- а) клетки Ашоффа
- б) клетки Ходжкина
- в) клетки Вирхова
- г) *клетки Пирогова–Лангханса

2. Выберите стадию поражения суставов при ревматоидном артрите:

- а) стадия гнойного синовита
- б) *стадия образования паннуса с разрушением суставного хряща
- в) стадия гемосидероза
- г) стадия околосуставного фиброза

3. Назовите стадии поражения суставов при ревматоидном артрите:

- а) *стадия серозного синовита
- б) *стадия образования паннуса с разрушением суставного хряща
- в) стадия гемосидероза
- г) *фиброзно-костный анкилоз

4. Перечислите стадии дезорганизации соединительной ткани при ревматизме:

- а) *мукоидное и фибриноидное набухание
- б) гидropическая дистрофия
- в) клеточные реакции
- г) *склероз

5. Выберите из приведенного перечня миокардит, характерный для ревматизма:

- а) очаговый экссудативный
- б) фибропластический
- в) фибриноидный
- г) *гранулематозный

6. Рубрификация гипертонической болезни при кровоизлиянии в мозг:


<p>а) основное заболевание; б) *фоновое заболевание; в) осложнение основного заболевания; г) сопутствующее заболевание.</p>
<p>7. При гистологическом исследовании в гранулеме при туберкулезе выявляются</p> <p>а) нейтрофильные лейкоциты б) *клетки Пирогова-Лангханса в) гигантские клетки инородных тел г) *эпителиоидные клетки д) ксантомные клетки а) клетки Микулича</p>
<p>8. Из какой ткани (преимущественно) состоит стенка хронической аневризмы сердца:</p> <p>а) некротизированной б) грануляционной в) *соединительной г) жировой</p>
<p>9. Фибриноидный некроз чаще всего локализуется</p> <p>а) в паренхиме печени б) в поджелудочной железе в) *в клапанах сердца г) в костной ткани д) *в стенке сосуда е) в сетке желчного пузыря</p>
<p>10. Назовите тканевую реакцию, определяющую развитие гранулематозного воспаления:</p> <p>а) *пролиферативная б) инфильтрация в) экссудация г) некроз</p>

4. Содержание оценочных средств промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой, в формате тестов и ситуационных задач.

ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 3 УРОВНЯ (ЗАДАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ)

Для какого заболевания характерно подобное изменения сердца:




стеноз митрального клапана
постинфарктный кардиосклероз
простое ожирение сердца
*гипертрофическая кардиомиопатия

Диагностируйте патологический процесс по макрофотографии




*Атеросклероз аорты с пристеночным тромбом
Пристеночный красный тромб в вене
Обтурирующий тромб в аневризме аорты
Брюшной тиф (мозговидное набухание пейеровой бляшки)

Для какого заболевания характерно подобное изменения сердца:



атеросклероз венечных артерий
*гипертоническая болезнь
подострый гломерулонефрит
симптоматическая гипертензия

Диагностируйте патологический процесс по макрофотографии:



*Возвратно-бородавчатый эндокардит
Приобретенный порок сердца
Папиллярный миокардит
Гипертрофическая кардиомиопатия

Диагностируйте патологический процесс по макрофотографии:




*Стеноз митрального клапана
Бактериально-септический миокардит
Аневризма синуса Вальсавы
Недостаточность митрального клапана

Диагностируйте патологический процесс по макрофотографии:




*фибринозный эпикардит
Гнойный эпикардит
«панцирное» сердце
Фибринозный перикардит

Диагностируйте патологический процесс по микрофотографии, предположите окраску:




*Мукоидное набухание, толуидиловый синий
Мукоидное набухание, окраска по ван Гизон
Амилоидоз эндокарда, окраска Конго-рот
Фибриноидный некроз, толуидиловый синий

Диагностируйте процесс по микропрепарату (удалены околоуставные мягкие ткани, Г-Э)




*Подагрический узел
Продуктивный синовит
Липома мягких тканей
Хондросаркома

Назовите заболевание и примененную специфическую окраску



*бурая индурация легких, окраска по Перлсу
крупозная пневмония, ШИК-реакция
амилоидоз надпочечника, Конго-рот
бурая индурация легких, окраска по Бесту

Диагностируйте патологический процесс по микрофотографии:



*Гранулематозный аппендицит при иерсинеозе
Язвенный колит
Дифтеритический колит при дизентерии
Флегмонозный аппендицит

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С СИТУАЦИЕЙ И ДАЙТЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

Задача №1

Мужчина 65 лет поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии. Жалобы при поступлении: на болевой синдром в правой нижней конечности, почернение кожи правой стопы. При осмотре правая нижняя конечность бледная, холодная, кожа правой стопы до нижней трети голени черного цвета. Частота дыхания 20 в мин. Аускультативно дыхание жесткое, мелкопузырчатые хрипы. Тоны сердца приглушены, аритмичные. АД 150/100 мм.рт.ст. Пульс 124 в минуту, аритмичный. Выполнена ампутация левой конечности на уровне нижней трети бедра. В процессе послеоперационного лечения состояние ухудшалось. Зафиксирована асистолия, реанимационные мероприятия без эффекта, констатирована биологическая смерть.

Посмертный клинический диагноз:

Основное заболевание: Мультифокальный атеросклероз с преимущественным поражением нижних конечностей.

Осложнения основного заболевания: Гангрена левой стопы. Ампутация левого бедра на уровне нижней трети. Полиорганная недостаточность.

Сопутствующие заболевания: Гипертоническая болезнь III ст. Сахарный диабет II типа.


Данные биохимического анализа крови: мочевины – 10,4 ммоль/л, глюкоза крови – 14,4 ммоль/л; билирубин общ – 7,2 ммоль/л.

Данные клинического анализа крови: лейкоциты – $26,6 \times 10^9$ /л, гемоглобин – 143 г/л, эритроциты – $5,1 \times 10^{12}$ /л, тромбоциты – 522×10^9 /л, гематокрит – 42,4%.

На вскрытии обнаружено: Труп мужчины пожилого возраста, гиперстенического телосложения, умеренного питания. Кожные покровы бледные. Трупные пятна синюшно-

фиолетового цвета, расположенные по задней поверхности тела и конечностей. Трупное окоченение умеренно выражено во всех группах мышц. Живот симметричный. Кости и суставы черепа, грудной клетки, позвоночника, таза, верхних и левой нижней конечности без видимой патологии. Правая нижняя конечность ампутирована до нижней трети бедра, ушитая операционная рана длиной 13,0 см с признаками грануляции, края раны бледной окраски. Интима аорты желтая, блестящая, с множественными, различной величины и формы бляшками, каменной плотности, бифуркация аорты каменной плотности с участками расслоения и изъязвленной поверхностью, и крошащимися хлопьевидными массами, устье правой подвздошной артерии полностью обтурировано схожими массами. Сердце размерами 11,0×8,0×5,5 см, эластичной консистенции, без очаговых изменений. Толщина миокарда левого желудочка 1,5 см, правого желудочка 0,3 см; межжелудочковой перегородки 1,3 см. Коронарные артерии с выдающимися в просвет бляшками серого цвета, каменной плотности, суживающие до 40% просвета. Легкие на ощупь воздушные, пористые, в базальных отделах тестоватой консистенции, на поверхность разреза выделяется большое количество пенящейся прозрачной жидкости. Поджелудочная железа 18,0×1,5×1,5 см, на разрезе дольки железы бежевого цвета окружены большим количеством жировой ткани желтого цвета. Почки по 9,5×5,5×4,5 см, поверхность мелкозернистая, на разрезе корковое вещество толщиной до 0,3 см, бледно-коричневого цвета, мозговое вещество красно-коричневого цвета. Остальные органы и системы соответствуют возрастной норме. Результаты микроскопического исследования: В сердце фрагментация и гипертрофия кардиомиоцитов. В печени центрлобулярное полнокровие. В почках фокальный сегментарный гломерулосклероз, гиалиноз. В поджелудочной железе выраженные липоматоз и склероз, атрофия паренхимы. В легких альвеолы заполнены слабозозинофильными бесклеточными массами.

Гистологические изменения клубочка почки:



Вопросы и задания:

1. Укажите основное заболевание, механизм смерти, непосредственную причину смерти.
2. Назовите заболевание, по причине которого произошли выявленные в почках изменения. Назовите другие изменения, характерные данному заболеванию, обнаруженные при аутопсийном и гистологическом исследовании.
3. Укажите влияние сахарного диабета на течение основного заболевания. Назовите место сахарного диабета в структуре диагноза в данном случае.
4. Назовите заболевание, о котором свидетельствуют морфологические изменения в почках. Укажите обнаруженные макроскопические изменения, характеризующие данное заболевание.

Ответы:

1. Распространенный атеросклероз с преимущественным поражением брюшной части аорты и артерий нижних конечностей в стадии осложненных поражений. Сердечный механизм.

Острая сердечная недостаточность.

2. Синдром Киммельстила-Уилсона (диабетический сегментарный гломерулосклероз).

Липоматоз и склероз с атрофией паренхимы поджелудочной железы.


3. Диабетическая дислипидемия способствует развитию атеросклероза независимо от степени повышения уровней общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотности, атерогенность которых усиливается при гипергликемии.

В данном диагнозе сахарный диабет должен быть отнесен к рубрике «фоновое заболевание».

4. Гипертоническая болезнь сердца. Гипертрофия миокарда левого желудочка (больше 12 мм) и межжелудочковой перегородки (больше 10 мм).

Задача №2

Пациент мальчик 2 лет. Планово госпитализирован в отделение детской онкологии. На этапе клинической диагностики обнаружена опухоль забрюшинного пространства. Компьютерная томография органов забрюшинного пространства показала опухолевое образование неправильной формы, с участками разной плотности с примерными размерами 67×56×42 мм расположенное в проекции правого надпочечника. Результаты лабораторной диагностики: в биохимическом анализе мочи повышена концентрация дофамина и ванилилминдальной кислоты. В клиническом анализе крови тромбоцитоз. В биохимическом анализе крови повышен уровень ферритина, нейронспецифической энолазы и лактатдегидрогеназы. Проведено хирургическое лечение. Материал опухолевой ткани поступает для морфологического исследования в патологоанатомическое бюро. Макроскопически опухоль представляет собой узловое образование с поверхности серо-желтого цвета размерами 70×60×50 мм с неровной бугристой поверхностью и неравномерной плотностью с участками мягко-эластичной и дряблой консистенции. На разрезе пестрой окраски за счет чередования участков желтого, серого, красного и бордового цветов. Гистологическая картина новообразования представлена на прикрепленной фотографии.



Вопросы и задания:

1. Какая опухоль представлена на фотографии?
2. Какие места первичной локализации характерны для данного новообразования?
3. С какими опухолями необходимо провести дифференциальную диагностику?
4. Риск возникновения опухолей каких органов выше у этого пациента по сравнению с популяцией?

Ответы:

1. Нейробластома.
2. Надпочечник, забрюшинное пространство, средостение.

3. Десмопластическая мелкокруглоклеточная опухоль, саркома Юинга, ганглионеврома, экстраодальная лимфома, меланома, злокачественная рабдоидная опухоль.

4. У данного пациента в дальнейшем повышен риск образования опухолей почек, а именно папиллярного почечноклеточного рака, хромофобной карциномы, онкоцитомы.