

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стегний Кирилл Владимирович
Должность: И.о. ректора
Дата подписания: 23.09.2026 18:59:32
Уникальный программный ключ:
d59234ba928aea5c04c54eb9013a367220b6b2ae

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор института стоматологии



_____/Первов Ю.Ю./
«8» июня 2026 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

**Б2.О.02(У) Ознакомительная практика (Неотложные состояния в
стоматологии. Основы сердечно-легочной реанимации)**

основной образовательной программы высшего образования

Специальность	31.05.03 Стоматология
Уровень подготовки	Специалитет
Направленность подготовки	02 Здравоохранение (в сфере оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях)
Форма обучения	Очная
Срок освоения ООП	5 лет
Институт/кафедра	Институт стоматологии

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Фонд оценочных средств регламентирует формы, содержание, виды оценочных средств для текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой (государственной итоговой) аттестации, критерии оценивания дифференцированно по каждому виду оценочных средств.

1.3. Фонд оценочных средств определяет уровень формирования у обучающихся установленных в ФГОС ВО и определенных в основной образовательной программе высшего образования по специальности 31.05.03 Стоматология, направленности 02 Здравоохранение (в сфере оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях) универсальных (УК) компетенций, общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций

https://tgmu.ru/sveden/files/auf/OOP_31.05.01_Stomatologiya_2026.pdf

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№ п/п	Виды аттестации	Оценочные средства
		Форма
1	Текущий контроль	Дневник по практике
2	Промежуточная аттестация	Дневник по практике
		Чек-листы (Приложение 1)
		Тестовые задания

3. Содержание оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации осуществляется преподавателем практики

Тестовые задания по Б2.О.02(У) Ознакомительная практика (Неотложные состояния в стоматологии. Основы сердечно-легочной реанимации)

Вид	Код	Текст компетенции / названия трудовой функции / названия трудового действия / текст
С	31.05.03	Стоматология
К	ОПК-7	Способен организовывать работу и принимать профессиональные решения в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения
И		ДАЙТЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 1 УРОВНЯ (ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ)
Т		1. Аллергия – это 1) аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена; 2) дерматит, характеризующийся быстрым появлением сильно зудящих, плоско приподнятых бледно-розовых волдырей; 3) остро развивающийся, быстро проходящий отек кожи и подкожной клетчатки или слизистых оболочек; 4) собирательное название группы типовых иммунологических процессов, развивающиеся в сенсibilизированном организме генетически предрасположенных индивидов, в форме вторичного иммунного ответа при контакте с антигеном, вызвавшим сенсibilизацию.+

	2. Астматический статус – это 1) длительно не купирующийся приступ удушья с развившейся относительной блокадой β-рецепторов с формированием тотальной бронхиальной обструкции, развитием легочной гипертензии и острой дыхательной недостаточностью;+ 2) острая сосудистая недостаточность, возникающая в результате изменения соотношения между объемом циркулирующей крови и емкостью сосудистого русла; 3) патологическое состояние, при котором не обеспечивается поддержание нормального газового состава крови либо оно достигается за счёт более интенсивной работы аппарата внешнего дыхания и сердца, что приводит к снижению функциональных возможностей организма; 4) угрожающее жизни патологическое состояние, обусловленное остро или подостро возникающим недостатком кислорода в крови и накоплением углекислоты в организме. 3. Виды обморока 1) ишемический; 2) мозговой;+ 3) рефлекторный;+ 4) сердечный.+ 4. Гипертонический криз – это 1) заболевание, основными проявлениями которого являются повышенное артериальное давление в частом сочетании с церебральными расстройствами сосудистого тонуса; 2) острая сосудистая недостаточность, возникающая в результате изменения соотношения между объемом циркулирующей крови и емкостью сосудистого русла; 3) резкое обострение гипертонической болезни на короткий срок, характеризующийся рядом нервно-сосудистых нарушений и последующими гуморальными реакциями;+ 4) снижение артериального давления, сопровождающееся слабостью и утомляемостью. 5. Идиосинкрия – это 1) болезненное, неукротимое влечение к лекарственному средству; 2) быстроразвивающаяся толерантность; 3) ослабление эффекта лекарственного средства при повторном введении; 4) повышенная чувствительность к медицинскому препарату.+ 6. Инфаркт миокарда – это 1) ишемический некроз сердечной мышцы, возникающий вследствие острого несоответствия между потребностью миокарда в кислороде и его кровоснабжением по коронарным артериям;+ 2) ишемия миокарда вследствие несоответствия между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой; 3) острая сосудистая недостаточность, возникающая в результате изменения соотношения между объемом циркулирующей крови и емкостью сосудистого русла; 4) резкое обострение гипертонической болезни на короткий срок, характеризующийся рядом нервно-сосудистых нарушений и
--	---

	последующими гуморальными реакциями. 7. К каким составным частям обезболивающего раствора может быть непереносимость? 1) вазоконстриктор;+ 2) дистиллированная вода; 3) парабены;+ 4) собственно анестетик.+ 8. Какие пациенты относятся ко 2 типу пациентов по соматическому состоянию? 1) «изможденный пациент»;+ 2) пациенты с непереносимостью лекарственных препаратов, тяжелыми заболеваниями;+ 3) пациенты, имеющие сопутствующие заболевания в стадии ремиссии;+ 4) практически здоровый пациент. 9. Какие препараты применяют для премедикации? 1) амоксициллин; 2) дексаметазон; 3) димедрол;+ 4) кетанов.+ 10. Какие стадии включает клиника обморока? 1) нарушение сознания;+ 2) постобморочный период;+ 3) предобморочное состояние;+ 4) сопор. 11. Клиника отека Квинке в области гортани 1) «лающий кашель»;+ 2) брадикардия; 3) затрудненное дыхание;+ 4) цианотичность кожных покровов. 12. Клиническая картина нарушений ритма сердца характеризуется 1) болевым синдромом с локализацией боли в надчревной области; 2) неприятными ощущениями в области сердца;+ 3) признаки расстройства кровообращения и сердечной недостаточности (набухание подкожных вен, цианоз на периферии тела);+ 4) чувством трепетания, беспокойством.+ 13. Клиническая картина типичной формы ишемии сердца характеризуется 1) болевым синдромом с локализацией боли в надчревной области; 2) давящей, сжимающей болью за грудиной;+ 3) иррадиацией боли в левую руку, левую лопатку, шею, нижнюю челюсть;+ 4) нарушениями ритма сердца. 14. Клинические признаки коллапса 1) потеря сознания;
--	---

	2) снижение артериального давления;+ 3) холодный липкий пот;+ 4) частый слабый пульс.+ 15. Клинические признаки потери сознания 1) бедность кожных покровов;+ 2) повышение мышечного тонуса; 3) расширение зрачков;+ 4) цианотичность. 16. Когда проводится премедикация? 1) за 10 минут до манипуляции; 2) за 2 часа до манипуляции; 3) за 30-40 минут до манипуляции;+ 4) за 6 часов до манипуляции. 17. Количество клинических вариантов течения анафилактического шока 1) 2; 2) 4; 3) 6;+ 4) 8. 18. Коллапс – это 1) бессознательное состояние, которое сопровождается нарушением рефлекторной деятельности и дисфункцией внутренних органов на фоне угнетения коры головного мозга и подкорковых структур; 2) глубокое угнетение сознания с утратой произвольной и сохранностью рефлекторной деятельности; 3) острая сосудистая недостаточность, возникающая в результате изменения соотношения между объемом циркулирующей крови и емкостью сосудистого русла;+ 4) приступ кратковременной потери сознания, обусловленный преходящей ишемией головного мозга, связанный с ослаблением сердечной деятельности и острым нарушением регуляции сосудистого тонуса. 19. Компрессии на грудину взрослого человека необходимо производить 1) всей ладонью; 2) одним пальцем; 3) проксимальной частью ладони;+ 4) тремя пальцами. 20. Крапивница – это 1) аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена; 2) локальные высыпания на коже, состоящие из волдырей и эритемы, сопровождающиеся зудом кожи;+ 3) неприятное ощущение раздражения, жжения и покалывания в каком-либо участке кожи, вызванное различными причинами; 4) образование клиновидных дефектов зубов ребенка; 5) остро развивающийся, быстро проходящий отек кожи и
--	---

	подкожной клетчатки или слизистых оболочек. 21. Лечение ишемии миокарда включает 1) баралгин 5-10 мл на глюкозе;+ 2) нитроглицерин 0,0005 г – 1-2 таблетки под язык;+ 3) папаверин 2% – 2 мл;+ 4) эпинефрин 0,1% – 1мл. 22. Метод профилактики непереносимости составляющих анестезирующих средств 1) применение блокаторов H1-рецепторов; 2) применение глюкокортикостероидов; 3) проба Кононенко;+ 4) скарификационный тест. 23. Наиболее опасная для жизни локализация ангионевротического отека 1) отек глаз; 2) отек гортани;+ 3) отек губ; 4) отек слизистой оболочки полости рта. 24. Неотложная помощь при анафилактическом шоке включает 1) введение 0,1% раствора адреналина 0,5 мл в 5 мл изотонического раствора внутривенно;+ 2) введение преднизолона; 3) введение супрастина; 4) применение нитроглицерина. 25. Неотложная помощь при астматическом статусе включает 1) преднизолон 2-3 мг/кг массы тела внутривенно;+ 2) супрастин в/в 2% – 2мл; 3) эпинефрин 0,1% – 1 мл; 4) эуфиллин 2,4% – 15 мл.+ 26. Неотложная помощь при гипертоническом кризе включает 1) введение адреналина 0,1% – 1 мл; 2) дибазол 0,5% – 5 мл подкожно;+ 3) лазикс 20 мг внутривенно;+ 4) пентамин 5% внутривенно на глюкозе.+ 27. Неотложная помощь при обмороке включает 1) введение эуфиллина; 2) вдыхание паров нашатырного спирта;+ 3) придание горизонтального положения, обеспечение притока свежего воздуха;+ 4) прием нитроглицерина. 28. Неотложная помощь при отеке Квинке 1) капотен; 2) преднизолон в/в 1-2 мг/кг;+ 3) супрастин в/в 2% – 2мл;+ 4) эпинефрин 0,1% – 1 мл.
--	---

	29. Обморок – это 1) аллергическая реакция немедленного типа, состояние резко повышенной чувствительности организма, развивающееся при повторном введении аллергена; 2) бессознательное состояние, которое сопровождается нарушением рефлекторной деятельности и дисфункцией внутренних органов на фоне угнетения коры головного мозга и подкорковых структур; 3) острая сосудистая недостаточность, возникающая в результате изменения соотношения между объемом циркулирующей крови и емкостью сосудистого русла; 4) приступ кратковременной потери сознания, обусловленный преходящей ишемией головного мозга, связанный с ослаблением сердечной деятельности и острым нарушением регуляции сосудистого тонуса.+ 30. Показания к премедикации 1) аллергические реакции на местные анестетики; 2) пациенты с психо-эмоциональным возбуждением;+ 3) пациенты со значительным колебанием артериального давления наряду с препаратами, нормализующими работу сердечно-сосудистой системы;+ 4) при длительных и травматических вмешательствах.+ 31. Правильное соотношение вдохов и компрессий на грудину при проведении СЛР взрослому человеку 1) 1:15; 2) 1:30;+ 3) 2:20; 4) 2:30. 32. Признаки повышенной чувствительности при пробе Кононенко 1) бледность кожных покровов;+ 2) головокружение;+ 3) повышение температуры; 4) слабость.+ 33. Применение адреналина может спровоцировать 1) гипертонический криз;+ 2) гиперфункцию надпочечников; 3) декомпенсацию сердечной деятельности;+ 4) острый приступ глаукомы.+ 34. Приступ стенокардии – это 1) заболевание, основными проявлениями которого являются повышенное артериальное давление в частом сочетании с церебральными расстройствами сосудистого тонуса; 2) ишемический некроз сердечной мышцы, возникающий вследствие острого несоответствия между потребностью миокарда в кислороде и его кровоснабжением по коронарным артериям; 3) ишемия миокарда вследствие несоответствия между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой;+ 4) острая сосудистая недостаточность, возникающая в результате изменения соотношения между объемом циркулирующей крови и емкостью сосудистого русла.
--	--

		35. Причины возникновения неотложных состояний 1) наличие отрицательных эмоциональных воспоминаний о посещении стоматологического кабинета в прошлом; 2) наличие сопутствующей патологии;+ 3) непереносимость составляющих анестезирующих растворов;+ 4) эмоционально-болевой синдром.+ 36. Причины эмоционально-болевого синдрома 1) аллергические реакции на местные анестетики; 2) наличие сопутствующей соматической патологии; 3) особенность темперамента пациента;+ 4) страх перед медицинским вмешательством.+ 37. Проведение пробы по Кононенко 1) 0,2-0,3 мл анестетика вводят в слизистую оболочку;+ 2) капельная проба под язык; 3) подкожное введение; 4) прик-тест. 38. Продолжительность ангионевротического отека (отека Квинке) 1) 10-12 часов;+ 2) 2-3 часа; 3) 24 часа; 4) 48-72 часа. 39. Сколько длится сенсibilизация? 1) 1 месяц; 2) 1-2 дня; 3) 3-4 дня; 4) 7-12 дней.+ 40. Сколько стадий включает патогенез аллергии? 1) 2; 2) 3;+ 3) 4; 4) 5. 41. Сколько существует типов гипертонического криза? 1) 2;+ 2) 3; 3) 4; 4) 5. 42. Сколько существует типов иммунологической реакции? 1) 2 типа; 2) 3 типа; 3) 4 типа;+ 4) 6 типов. 43. Скорость возникновения анафилактического шока 1) 24 часа; 2) 3-5 часов; 3) 6-8 часов;
--	--	--

	4) от нескольких секунд до 2 часов.+ 44. Стадии патогенеза аллергической реакции 1) иммунологическая;+ 2) патофизиологическая;+ 3) патохимическая;+ 4) стадия десенсибилизации. 45. Что относится к способам профилактики возникновения эмоционально-болевого синдрома? 1) адекватное обезболивание;+ 2) консультация психотерапевта; 3) премедикация;+ 4) сбор анамнеза.+
--	---

Критерии оценивания

«Отлично» - более 91% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Хорошо» - 81-90% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Удовлетворительно» - 71-80% правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

«Неудовлетворительно» - 70% и менее правильных ответов на тестовые задания каждого уровня

4. Критерии оценивания результатов обучения

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину; самостоятельно, в логической последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы, подчеркивает при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-следственные связи; четко формирует ответы.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, если он владеет знаниями дисциплины почти в полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если он владеет основным объемом знаний по дисциплине; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускает ошибки по существу вопросов.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, если он не освоил обязательного минимума знаний предмета, не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах экзаменатора.

Чек-лист оценки практических навыков

Название практического навыка Экстренная и неотложная медицинская помощь (первая помощь)

С	31.05.03	Стоматология	
К	ОПК-7	Способен организовывать работу и принимать профессиональные решения в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий и в очагах массового поражения	
	Действие	Проведено	Не проведено
1.	Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего	1 балл	-1 балл
2.	Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки	1 балл	-1 балл
3.	Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути	1 балл	-1 балл
4.	Определить признаки жизни		
5.	Приблизить ухо к губам пострадавшего	1 балл	-1 балл
6.	Глазами наблюдать экскурсию грудной клетки пострадавшего	1 балл	-1 балл
7.	Считать вслух до 10	1 балл	-1 балл
8.	Вызвать специалиста (СМП) по алгоритму:		
9.	Факт вызова бригады	1 балл	-1 балл
10.	•Координаты места происшествия	1 балл	-1 балл
11.	•Количество пострадавших	1 балл	-1 балл
12.	•Пол	1 балл	-1 балл
13.	•Примерный возраст	1 балл	-1 балл
14.	•Состояние пострадавшего	1 балл	-1 балл
15.	•Предположительная причина состояния	1 балл	-1 балл
16.	•Объём Вашей помощи	1 балл	-1 балл
17.	Подготовка к компрессиям грудной клетки		
18.	Встать на колени сбоку от пострадавшего лицом к нему	1 балл	-1 балл
19.	Освободить грудную клетку пострадавшего от одежды	1 балл	-1 балл
20.	Основание ладони одной руки положить на центр грудной клетки пострадавшего	1 балл	-1 балл
21.	Вторую ладонь положить на первую, соединив пальцы обеих рук в замок	1 балл	-1 балл
22.	30 компрессий подряд	1 балл	-1 балл
23.	•Руки обучающегося вертикальны	1 балл	-1 балл
24.	•Не сгибаются в локтях	1 балл	-1 балл
25.	•Пальцы верхней кисти оттягивают вверх пальцы нижней	1 балл	-1 балл
26.	•Компрессии отсчитываются вслух	1 балл	-1 балл
27.	Искусственная вентиляция легких		
28.	Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего	1 балл	-1 балл
29.	1 и 2 пальцами этой руки зажать нос пострадавшему	1 балл	-1 балл
30.	Подхватить нижнюю челюсть пострадавшего двумя пальцами другой руки	1 балл	-1 балл
31.	Запрокинуть голову пострадавшего, освобождая дыхательные пути, набрать воздух в лёгкие	1 балл	-1 балл
32.	Обхватить губы пострадавшего своими губами	1 балл	-1 балл
33.	Произвести выдох в пострадавшего	1 балл	-1 балл

34.	Освободить губы пострадавшего на 1-2 секунды	1 балл	-1 балл
35.	Повторить выдох пострадавшего	1 балл	-1 балл
	Итого		

Общая оценка:

«Зачтено» не менее 71% выполнения

«Не зачтено» 70 и менее% выполнения